

## Odporúčané očkovanie detí NEHRADENÉ zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2026\*

ROČNÍK NARODENIA	ODPORÚČANÉ OČKOVANIE (NEHRADENÉ ZP)		
	VEK	DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
X	podľa zvoleného veku	tuberkulóza (TBC)	I. dávka
2026	vo veku 6 - 24 týždňov (Rotarix) vo veku 6 - 32 týždňov (Rotateq)	rotavírusové infekcie	2 až 3 dávky podľa zvolenej vakcíny**
X	skupina B - od 2 mesiacov alebo 10 rokov - podľa druhu vakcíny (Bexsero od 2 mes., Trumenba od 10 r.)	meningokokové infekcie	1 až 3 dávky a posilňovacia dávka podľa zvolenej vakcíny a podľa veku v čase podania prvej dávky***
	skupiny A, C, W a Y (Nimenrix od 6 týždňov)		
X	od 1 roka	kliešťová encefalitída	I. dávka
			II. dávka
			III. dávka
			preočkovanie každé tri roky
2026 a staršie ročníky	od 1 roka	ovčie kiahne (varicella)	I. dávka
			II. dávka
X	podľa zvoleného veku	vírusová hepatitída A	I. dávka
			II. dávka

## Poznámky:

\* Odporúčané očkovanie môže byť čiastočne alebo plne hrazené na základe rozhodnutia príslušnej ZP

\*\* Rotarix: Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Vakcinačné schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov. Medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne.

\*\* Rotateq: Očkovacia schéma pozostáva z 3 dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov. Troj-dávková očkovacia schéma sa uprednostňuje ukončiť do veku 20 až 22 týždňov. Ak je to nevyhnutné, môže sa tretia (posledná) dávka podať do veku 32 týždňov. Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly.

\*\*\* V súlade s SPC k jednotlivým vakcínám proti meningokokovej meningitíde.